Bazele Creșterii de Porcine

Jim Ranck

The Ranck Family

Jim and Joan with grandchildren, from left: Adeline, Gemma, Bennett, Lexington and Jackson

Jeremy, Becky, Bennett and Gemma

Lexington, Jackson and Adeline

Alex and Amanda
Lexington, Adeline, Jackson

Rachael and Eric

Ce facem noi

- Lucrări agricole 200 hectare
- 300 Scroafe de la însămînțare la înțărcat
- 7700 porci pe an
- Creștem pui

Principii de bază

- Apă de calitate și cantitate bună
- Asigură hrană de calitate (fără mucegai)
- Hrană procesată corect
- Proporția corectă de ingrediente după vîrsta porcilor
- O zonă de dormit uscată și caldă

Purcele femele înainte de însămînțare

- Să aibă 135 kg. înainte de însămînțare
- Vaccinate conform recomandărilor veterinarului din zona respectivă

Însămînțare

- Însămînțare doar în călduri
- Îsămînțare de două ori la interval de 24 ore
- Păstrați în scris data de însămînțare
- Durata gestației este 115 zile
- Vaccinează conform recomandărilor veterinarului înainte de însămînțare
- Folosește un ac de 1.27mm x 3.8cm pentru porcii adulți

Gestația

Gestația – perioada înainte de fătare

- De la 2.5 la 3.5 kg. de hrană pe zi (depinde de temperatura încăperii și starea scroafei)
- Vaccinează conform recomandărilor medicului veterinar local
- Deparazitează 2-3 săptămâni înainte de fătare (de două ori poate fi necesar în funcție de produsul utilizat)
- Temperatura ideală e de 18 grade

Fătarea

Purceluși fericiți

Îngrijirea purceilor:

- Crește porția de hrană cu ½ kg pe zi 1-2 săptămîni înainte de fătare
- Asigură locul de fătare cald și uscat pentru purcei.
  - Temperatura în zona pentru purcei – 32 grade
- Taie dinții ascuțiți la purceluși imediat după fătare
- Injecții cu fier injectabil la fiecare după fătare
- Folosește ace de 0.9mm x 1.3cm la purcei
- Castrează purceii la 4-6 zile după fătare. Întotdeauna folosește o lamă nouă
- După fătare crește porția de hrană treptat după cum cresc purceii.

Vaccinarea purceilor

Întotdeauna aplică vaccina la purcei după ureche, în mușchii gîtului

Instrumente pentru castrare: scalpel
Instrument pentru tăierea dinților: Clește tăietor

Castrare corectă la 4 zile

Pulverizează peste zona de castrare pentru a preveni infectarea cu bacterii, ciuperci sau alte infecții. Blu-Kote folosit în imagine.

Purceluș castrat după 12 zile

Înțărcarea

- Asigură un loc cald și uscat pentru purcei să doarmă
  - 26-23 grade pentru purcei de 7-22kg
  - Nu lăsa purceii în frig
- Asigură amestecul de hrană necesar pentru mărimea lor
- Vaccinează conform recomandărilor medicului veterinar
- Folosește ace de 1.27mm x 1.6cm la purceii înțărcați

Creștere pînă la vînzare

23-19 grade ideal

Loc uscat pentru odihnă

Proporția corectă de produse în hrană

Hrană nelimitat

Feed Ingredients



JEREMY


DON'T
"EVER"
GIVE UP